

*Phänologischer Jahreskalender
des Sommerflieder (buddleja)*



Annika Löbbe

Der Sommerflieder (lat. Buddleja) ist einer der schönsten Blühsträucher.

Er duftet intensiv und lockt mit seinen Blüten zahlreiche Schmetterlinge an, weshalb er auch **Schmetterlingsstrauch** oder **Schmetterlingsflieder** genannt wird.



Wissenschaftlicher Name: Buddleja
Familie: Braunwurzgewächse
Ordnung: Lippenblütlerartige (Lamiales)

Sommerflieder wächst als
**Zier-Strauch in Gärten und
Parks**

ein bis zwei Meter hoch.
Seine Blütenrispen erscheinen
von Juni bis Ende September
in verschiedensten Farben.

Das Farb-Spektrum des Buddleja
reicht von Rosa über Violett zu
rötlich Purpur bis Gelb und
Weiss.



August



Die ersten Blütenrispen sind
verblüht.
Unterhalb dieser, wachsen
kleinere Blütenrispen nach.
Die Laubblätter sind noch grün.

September



Die letzten Blütenrispen sind
vertrocknet,
die Laubblätter werden gelb.

Januar



Die Rispen vertrocknet, das Laub
gefallen.
Es bilden sich schon frische
Triebe an den Astgabeln.

April



Nach dem Astschnitt im März,
bildet sich schnell das erste
Blattgrün.

Neue Äste entstehen, die im Laufe des Jahres verholzen.

Mai



Schnell wachsen die frischen Äste und bilden kräftiges Laub.

Juni (05.06.2022)



Der Strauch ist noch höher gewachsen.
Die ersten Rispenknospen sind zu erkennen.

Juni (26.06.2022)



Der Strauch hat noch stärkeres Laub bekommen.
Die großen Blütenrispen stehen nun in voller Blüte.

Juli



Tagpfauenauge



Zitronenfalter



Kohlweißling



Honigbiene

Durch den intensiven Geruch der Blüten werden zahlreiche Schmetterlinge und Bienen angelockt.

Admiral, Distelfalter und Kleiner Fuchs waren dieses Jahr leider nicht da.

Fotos: Annika Löbbbe

Quellen : Wikipedia, PlantNet



